



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – המועצה לענף הלול

תכנית חיסונים - תרנגולי הודו פטום

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
0 – 10 יום	TRT ("מחלת ההודים" APV) חי	ריסוס/טפטוף לעין/מי שתיה
0-7 יום	* ניוקסל חי	ריסוס/טפטוף לעין
12-14 יום ¹	* ניוקסל מומת אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה הזרקה
2 – 5 שבועות	דלקת מעיים דמית מומת אבעבועות	הזרקה דקירה
3-6 שבועות	TRT("מחלת ההודים" APV) חי פסטרלה מולטוצידה + רימרלה אנטיפסטיפר מומת ORT מומת	ריסוס / מי שתיה הזרקה הזרקה
4 (5) ² שבועות	* ניוקסל מומת אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה הזרקה
6 – 9 שבועות	פסטרלה מולטוצידה + רימרלה אנטיפסטיפר מומת ORT מומת אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה הזרקה הזרקה
6 – 10 שבועות	דלקת מח נגיפית (תרנגולי הודו)	הזרקה
9 - 10 שבועות	* ניוקסל חי או * מומת	ריסוס/טפטוף לעין הזרקה
12 – 14 שבועות	אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה

***חיסון חובה**

¹ ניוקסל מומת ראשון : לא יאוחר מגיל 14 יום.

TRT("מחלת ההודים" APV) : יש לדאוג למרווח של 7 ימים לפחות מחיסון ניוקסל חי.

² ניתן לדחות רק עד גיל 5 שבועות **(באישור בכתב מרופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות)** במידה ולא מעבירים למשק אחר.

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד :
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה : על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.